

کاربرد سرنگ‌های آماده-برای-استفاده ترومبوس ساخت شرکت سانوفی

راهنمای تزریق برای بیماران

پزشک برای شما یک هیپارین با وزن مولکولی پایین تجویز کرده است.

- بدین ترتیب باید یا از ترومبوس یا آمبولی ریه جلوگیری شود یا لخته موجود برطرف شود.
- تزریق می‌تواند به وسیله خود شما یا یکی از افراد مورد اعتمادتان انجام شود.

تزریق آسان

آماده‌سازی آسان

۴- سوزن را به صورت عمودی با زاویه ۹۰ درجه وارد کنید، به آرامی روی پیستون سرنگ فشار دهید و کل محتویات سرنگ را تزریق کنید (لطفا توجه داشته باشید که پزشک شما ممکن است دوزهای مختلفی به شما بدهد). پوست تا شده نباید رها شود.

این مهم است که شما پیستون سرنگ را به طور کامل فشار دهید تا مکانیسم محافظت فعال شود.

۵- پس از انجام تزریق به صورت کامل، سوزن را مستقیم به بیرون بکشید. پوشش محافظ روی سوزن می‌آید و آن را می‌بندد.

در این حالت، می‌توانید پوست تا شده را رها کنید.

۶- سرنگ مورد استفاده را درون ظرف زباله مقاوم در برابر سوراخ‌شدگی بیندازید. درب ظرف را با دقت ببندید و ظرف زباله را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

۱- دستانتان را بشویید. یک نقطه را در سمت راست یا چپ شکم خود انتخاب کنید. محل تزریق باید از هر طرف حداقل ۵ سانتی متر از ناف شما فاصله داشته باشد. محل انتخاب‌شده برای تزریق را با پنبه الکلی یا با آب و صابون تمیز کنید. آرام و راحت بنشینید یا دراز بکشید. هنوز باید بتوانید محل تزریق را ببینید.

۲- سرنگ را برداشته و درپوش محافظ آن را جدا کنید.

اگر قطره‌ای به نوک سوزن چسبیده باشد، باید آن را قبل از تزریق با ضربه زدن روی سرنگ از قبل پر شده، در حالی که سوزن به سمت پایین است، از بین برد.

حباب هوای موجود در سرنگ آماده-برای-استفاده نباید از بین برود!

۳- با استفاده از انگشت شست و انگشت اشاره، قسمتی از پوست در ناحیه تمیزشده را بر گردانید و تا بزنید و آن را تا زمان بیرون کشیدن سوزن تزریق به همین شکل نگه دارید.



اطلاعات بیشتر را می‌توانید در برنامه
Inject-App به دست بیاورید!



این راهنما جایگزین دستورالعمل‌های استفاده نمی‌شود. محتوای دستورالعمل‌های استفاده باید حتماً مورد توجه قرار گیرد.